

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DE
EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL EM
REGIÕES SEMI-ÁRIDAS

Malaquias da Silva Amorim Neto¹

Carlos Alberto Vasconcelos Oliveira²

Daniel Delfino da Silva³

RESUMO

A estimativa da evapotranspiração potencial (ETP) em regiões semi-áridas é realizada por vários métodos em função da disponibilidade de dados meteorológicos locais. Com o objetivo de analisar a validade dos métodos mais usuais para esta região, realizou-se um estudo comparando medidas de ETP realizadas em evapotranspirômetro tipo Thornthwaite de lençol freático constante com estimativas por diferentes métodos. Os resultados obtidos com os respectivos coeficientes de correlação foram os seguintes: Método do Tanque Classe A, 0,82; Radiação Solar, 0,81; Thornthwaite, 0,58; Penman, 0,82; Blaney-Criddle, 0,32; Jensen-Haise, 0,68; Hargreaves, 0,68; Benavides-Lopez, 0,86 e Linacre, 0,86.

¹ Meteorologista, M.Sc. EMBRAPA- Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA) BR 428, Km 152, Caixa Postal, 23, CEP - 56.300, Petrolina, PE.

² Estatístico, B.Sc. EMBRAPA- Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA) BR 428, Km 152, Caixa Postal, 23 CEP- 56.300, Petrolina, PE.

³ Engº Agrícola, B.Sc. Bolsista CNPq/EMBRAPA- Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA) BR 428, Km 152, Caixa Postal, 23, CEP- 56.300, Petrolina - PE.