

## FREQUÊNCIA DE VERANICOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

*Rogério Remo Alfonsi*<sup>1</sup>  
*Hilton Silveira Pinto*<sup>2</sup>  
*Hermano Vaz de Arruda*<sup>3</sup>

O presente trabalho procura fornecer, para as várias regiões do estado, um levantamento da possibilidade da ocorrência dos períodos secos nos meses de Janeiro e Fevereiro, baseado em dados de frequências relativas.

Os dados pluviométricos diários utilizados foram obtidos nas estações meteorológicas da rede do Instituto Agrônomo e do Dept<sup>o</sup>. de Águas e Energia Elétrica (DAEE), num total de 29, com períodos de observações variáveis entre 16 a 27 anos. Considerou-se como verânico, os decendios com totais pluviométricos inferiores a 40 mm, assumindo uma perda de água de cerca de 4mm por dia.

O período de 25 de Janeiro a 15 de Fevereiro representa a época de maior probabilidade de ocorrência dos veranicos, para a maioria das regiões do Estado de São Paulo.

---

(1) - Instituto Agrônomo - Climatologia Agrícola - CNPq.

(2) - UNICAMP - IB. CNPq.

(3) - Instituto Agrônomo - Técnica Experimental.